

مزایای شالدون

۱. بلافاصله قابل استفاده است و برای اتصال به دستگاه نیاز به سوزن ندارد.

عوارض نادر

۱. خونریزی
۲. آسیب به بافت اطراف به خصوص شریان مجاور
۳. آسیب به ریه

عوارض دیررس

۱. عفونت
۲. ایجاد لخته و یا تنگی در مسیر لوله پلاستیکی آن
۳. در صورت وقوع خونریزی و یا آسیب به عروق مجاور به ندرت نیاز به اقدام خاصی است و با استراحت و روشهای غیر تهاجمی قابل کنترل است.

هنگامی که کلیه فردی دچار اختلال و نارسایی می شود از دستگاه کلیه مصنوعی جهت خارج کردن مواد زاید خون استفاده می شود که به آن دیالیز می گویند. برای انجام دیالیز نیاز به یک رگ با جریان خون کافی داریم که این رگ را می توان با استفاده از شالدون (کاتتر داخل وریدی) و یا قیستول بین شریان و ورید (AVF) به دست آورد. شالدون کاتتر داخل وریدی می تواند به صورت دائم یا موقت باشد. یک لوله پلاستیکی نرم است که از طریق پوست در یک رگ مرکزی در کشاله ران یا گردن می گذارند تا از طریق آن بتوانند خون را ارد دستگاه دیالیز کنند و تصفیه انجام شود.

معایب

۱. به صورت موقتی است
۲. مستعد عفونت است.
۳. ممکن است با ایجاد لخته در مسیر آن جریان خون متوقف شود.
۴. باید برای دوش گرفتن روی کاتتر را پوشاند.

آمادگی قبل از عمل

۱. قبل از جایگذاری دوش بگیرید و موهای محل مورد نظر را بتراشید .
۲. در صورت مصرف داروهای فشار خون یا رقیق کننده خون پزشک خود را در جریان قرار دهید
۳. نیاز به ناشتا بودن ندارد
۴. معمولاً نیاز به بستری در بیمارستان ندارد
۵. نیازی به خوردن آنتی بیوتیک یا مسکن خاصی قبل و یا بعد از شالدون گذاری نیست
۶. شالدون کار گذاشته شده در کشاله ران تا حدود یک هفته و شالدون موجود در گردن تا حدود ۱۱ روز الی ۲ ماه و شالدون دائم تا ۱۲ ال ۲۴ ماه قابل استفاده است.
۷. قطع مصرف آسپرین ۳ روز قبل و پلاویکس ۵ روز قبل و وارفارین با نظر پزشک باید صورت گیرد.




دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

درمانی قزوین

مرکز آموزشی درمانی ولایت

مراقبت از کاتتر شالدون



دفتر پرستاری

واحد آموزش

۸- از محل شالدون بدون نظر پزشک و به

صورت خودسرانه دارو تزریق نکنید و یا

نمونه نگیرید

۹- در صورت جابجایی شالدون هرگز آن را به

جلو و عقب نکشید.

۱۰- وسیله مناسب جهت پانسمان در منزل

داشته باشید.

۱۱- در صورت بروز تنگی نفس ، خونریزی یا

خون مردگی در محل شالدون به پزشک

مراجعه کنید .

۱۲- در صورت خروج شالدون از محل آن را به

صورت خودسرانه هرگز دوباره جایگذاری

نکنید و به پزشک خود مراجعه کنید .

شالدون دائم

۱- بعد از یک هفته بخیه را می کشند .

۲- حمام کردن بلافاصله بلا مانع است .

۳- بعد از یک هفته دیگر نیازی به پانسمان

نیست .

۴- مصرف داروها مانند شالدون موقت است و

باید حتما زیر نظر پزشک باشد .

۵- سایر موارد مانند شالدون موقت است .

۸. اگر داروی فشار خون مصرف می کند با

کنترل فشار و زیر نظر پزشک دارو را قطع

یا مصرف کنید. از تغییر مقدار مصرف

داروهای فشار بدون اطلاع پزشک خود جدا

خودداری کنید.

مراقبت بعد از عمل

۱- جلوگیری از تماس آب با شالدون

۲- پس از دوش گرفتن پانسمان را حتما

عوض کنید

۳- از فعالیت سنگین که باعث خستگی و یا

افزایش فشار داخل شکم شود خودداری

کنید

۴- در صورت وقوع تب، درد ، لرز و خونریزی

در محل حتما به پزشک مراجعه کنید

۵- روزانه پانسمان را عوض کنید

۶- روی محل شالدون خود نخوابید

۷- روی محل شالدون خود ضربه وارد نکنید یا

آن را نکشید